

CADRO D: ZONAS DE LIBRE MARISQUEO

| Marisqueo dende embarcación | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| Especies | Cotas máximas de captura | |
| | kg/ tripulante enrolado e a bordo/día | kg/embarcación/día |
| Zamburiña (<i>Chlamys varia</i>) | 50 | 150 |
| Voandeira (<i>Aequipecten opercularis</i>) | | |
| Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>) | 20 | 60 |
| Ameixa fina (<i>Ruditapes decussatus</i>) | 3 | 9 |
| Ameixa babosa (<i>Venerupis corrugata</i>) ¹ | 5 | 15 |
| Ameixa xaponesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>) | 5 | 15 |
| Ameixa rubia (<i>Venerupis rhomboides</i>) ¹ | 15 | 45 |
| Reló (<i>Dosinia exoleta</i>) ² | 25 | --- |
| Carneiro (<i>Venus verrucosa</i>) | 8 | --- |
| Ameixa bicuda (<i>Venerupis aurea</i>) | 5 | --- |
| Cadelucha (<i>Donax trunculus</i>) | 20 | 60 |
| Ostra (<i>Ostrea edulis</i>) ³ | 250 ud | 500 ud |
| Outros moluscos | - | 30 |

(1) A equivalencia, para os efectos de topes de captura, entre ameixa babosa e ameixa rubia será de 1/2.

(2) A extracción do reló requirirá a súa autorización expresa.

(3) Para o caso da ostra, as cotas máximas están fixadas en unidades, e non en quilogramos.

| Marisqueo a pé | |
|--|---|
| Especies | Cota máxima de captura (kg/ mariscador/día) |
| Ameixa fina (<i>Ruditapes decussatus</i>) | 3 |
| Ameixa babosa (<i>Venerupis pullastra</i>) | 5 |
| Cadelucha (<i>Donax trunculus</i>) | 3 |
| Ameixa xaponesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>) | 5 |
| Outros moluscos | 15 |